


**Алгоритм реанимации и стабилизации состояния доношенных и недоношенных новорожденных детей  
гестационного возраста 33 недели и более**

Рождение  
Отсроченное пережатие или сцеживание пуповины



ДА  
Рутинные мероприятия

НЕТ

- Положить на реанимационный столик на спину, головой к врачу
- Определить признаки живорождения
- Обсушить, убрать мокрую пеленку.
- Подключить температурный датчик, пульсоксиметр/ЭКГ
- Провести санацию верхних дыхательных путей (по необходимости)
- Провести тактильную стимуляцию


60 секунд




НЕТ  
ИВЛ через маску<sup>1,2</sup>

ДА  
CPAP

НЕТ  
Рутинные мероприятия



НЕТ  
Интубация, ИВЛ



ДА  
Стабилизация состояния, продолжить респираторную терапию, транспортировка в ПИТ/ОРИТН

- 100% O<sub>2</sub>
- Непрямой массаж сердца
- Катетеризация v.umbilicalis
- Отключить обогрев (для детей > 35 недель гестации)



НЕТ  
Медикаментозная терапия

<sup>1</sup> В качестве старта респираторной терапии возможно использование маневра «продленного вдоха»  
<sup>2</sup> При ЧСС 60-100 уд в мин продолжается ИВЛ через маску в течение 1 мин, при отсутствии положительной динамики проводится интубация; при отсутствии или нерегулярном дыхании и ЧСС более 100 уд в мин ИВЛ через маску можно продлить до 3-5 минут